



Kenmerken

- Man heeft in prachtkleed een groene kop, witte nekband en donkerbruine borst.
- Stuit en middelste gekrulde staartveren zijn zwart.
- Het vrouwtje is onopvallender bruin. De donkerblauwe "spiegel" met witte rand op de vleugel is een gedeelde eigenschap en een goed kenmerk om vrouwtje te onderscheiden. Na het broedseizoen lijkt de man meer op het vrouwtje. Aan de kleur van de snavel zijn ze dan nog te onderscheiden; zeemkleurig bij de vrouw, die van de man geel. Wilde eenden hebben oranje poten.

Weetjes

- Stuit en middelste gekrulde staartveren zijn zwart.
- Na het broedseizoen lijkt de man meer op het vrouwtje. Aan de kleur van de snavel zijn ze dan nog te onderscheiden; zeemkleurig bij de vrouw, die van de man geel.
- Wilde eenden hebben oranje poten.
- Heeft een lange broedperiode die van februari tot augustus kan duren. Gedurende die tijd heeft de wilde eend een broedsel meestal bestaande uit 7 tot 11 eieren (maar kan lopen van 1-13).
- Broedduur: 24-32 dagen. Het nest is een ondiep kuiltje in de buurt van water, bedekt met mos, donsveertjes en takjes.
- Broedt in paartjes of in losse groepen.
- De jongen kunnen na 52-70 dagen vliegen.

Waterhoen

Kenmerken

- Zwart verenkleed, met witte vlekken langs de flanken.
- Opvallende witte onderstaart dekveren met zwarte middenstreep.
- Rode snavel met gele punt.
- Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhooggericht.



Weetjes

- Broedt van maart-augustus. Heeft één tot wel drie legsels per jaar bestaande uit meestal 5-9 eieren.
- Meerdere vrouwtjes leggen soms eieren in hetzelfde nest, zogenoemde dumpnesten (vanaf 12 eieren).
- Jongen uit een eerder broedsel helpen mee met het verzorgen van kuikens uit een later nest.
- De jongen kruipen meteen uit het nest en kunnen na een dag of 49 vliegen.

Kenmerken

- Typische zeer lange snavel.
- Opvallende strepen op kop en rug. Gebandeerde flanken.
- De watersnip vliegt bij verstoring vaak ver weg in zigzaggende vlucht; laat daarbij een schorre roep horen.



Weetjes

- Territoriaal, monogaam. Paren worden meestal in het broedgebied gevormd, mannetjes arriveren eerder. Nest op de grond, goed verstopt in de vegetatie.
- Eén, soms twee broedsels, meestal vier eieren. Legtijd april-juni (in het noorden).
- Heeft een zachte bodem nodig. Buiten de broedtijd vooral in natte graslanden, slootkanten, lage moerasvegetaties e.d.
- Gevarieerd menu van kleine ongewervelde dieren, zoals insecten en hun larven (onder meer emelten), wormen, kleine kreeftachtigen, slakjes, spinnen. Soms plantaardig materiaal (vooral zaden). Zoekt voedsel op de tast met de snavel in de bovenste laag van vochtige of natte bodem. Hierbij wordt de snavel in een snel ritme verticaal de bodem ingestoken. Foerageert meestal in kleine groepjes.

Kenmerken

- Nijlganzen zijn vaal grijsbruin gekleurd met roodbruine bovendelen.
- Op de borst zit een donkere vlek en de kop en hals zijn lichter, met een opvallende donkere vlek rondom het oog
- De vleugels zijn zwart met een groenglanzende spiegel en een groot wit vlak.
- Roze, lange poten
- Jonge nijlganzen zijn lichter van kleur en hebben geen vlekken rond oog en op de borst.



Weetjes

- Kan het hele jaar broeden, maar meestal van eind maart tot eind mei.
- Eén of twee broedsels per jaar, meestal 6-9 eieren. Nest wordt fel verdedigd.
- Het nest bevindt zich vaak in boomholtes of onder struik/boom bij water.
- Broeden ook in oude nesten van blauwe reigers, ooievaars en, tot diep in bos, van buizerds en haviken. Broedduur 28-30 dagen, jongen (nestvlieders) na 65-70 dagen vliegvlug.
- Trekken daarna nog lang als familie rond.
- Nijlganzen foerageren op graslanden waar ze gras en kruiden eten; ook eten ze oogstresten op bouwland, met name mais.

Kenmerken



- Het kan een uitdaging zijn om welke meeuw je nu precies ziet.
- Een volwassen zilvermeeuw kan sterk op andere meeuwen lijken maar is vooral goed te onderscheiden door zijn roze poten.
- De kleine mantelmeeuw lijkt op de zilvermeeuw alleen heeft de kleine mantelmeeuw gele poten en een donkergrijze mantel.
- De kokmeeuw heeft in zomerkleed een meer chocoladebruine kleur kop. Maar op een afstandje kan dit alsnog redelijk zwart ogen

Weetjes

- In België leven ca 2.300 zilvermeeuwen, ca 20.000 kokmeeuwen en ca 4.600 kleine mantelmeeuwen
- Ouderdom; zilvermeeuw ca 32j, kokmeeuw ca 7j, kleine mantelmeeuw ca 26j.
- Zilvermeeuw eet overwegend vis, afval, bodemdieren
- Kokmeeuw eet insecten, aardwormen, afval, bodemdieren
- Kleine mantelmeeuw eet vis, afval, aardwormen.



Kenmerken

- Volledig roetgrijs gekleurd met een zwarte kop en een smalle witte vleugelachterrand
- Spitse, witte snavel en witte bles. Adulten hebben een rode iris.

Weetjes

- Heeft een (zelden twee); max. drie vervolglegels per broedseizoen.
- Eileg van half maart tot in juli, met piek eind april en in mei. Meestal 5-10 eieren
- Broedduur: 21-25 dagen. Broedt meestal in de buurt van andere meerkoeten.
- De jongen verlaten het nest meteen en kunnen na zo'n 56 dagen vliegen. Worden in het begin gevoerd door de ouders.
- Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren, zoals slakken en visjes, gevoerd en gegeten. Ze eten ook gras.
- Meerkoeten duiken vaak naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze moeite doen om onder water te komen; ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten af. Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven.

Canadese gans



Kenmerken

- Een grote bruingrijze gans met zwarte hals en kop.
- Het meest opvallend is de witte halsvlek
- Het uiterlijk is echter behoorlijk variabel en zeker door kruisingen met andere soorten komen soms verrassende tussenvormen voor.

Weetjes

- Broedt van half maart/begin april tot mei. De 4-7 eieren worden over een periode van zo'n 9 dagen gelegd.
- Het vrouwtje broedt deze gedurende 26-27 dagen uit, waarbij het mannetje de wacht houdt.
- De jongen komen ongeveer tegelijk uit het ei en verlaten als familie na een dag het nest.
- Na anderhalf tot twee maanden zijn de jongen vliegvlug.



Blauwe reiger



Kenmerken

- Staand op hoge poten is de blauwe reiger niet moeilijk te herkennen
- De naam 'blauwe' is misschien wat teleurstellend; de vogels zijn vooral grijs.
- Een blauwe reiger - zeker jonge vogels - kunnen er verfromfaaid uitzien.
- Een paar lange, sierlijk afhangende veren vanaf de zwarte kopstreep. Geeloranje dolksnavel, afhangende sierveren over keel en op de rug.
- De poten steken in vlucht duidelijk achter het lichaam uit.

Weetjes

- Overal te vinden waar ondiep water voorhanden is dat in voldoende voedsel voorziet.
- Om te broeden zijn bomen onmisbaar, daar waar de combinatie te vinden is, zijn blauwe reigers nooit ver weg
- Blauwe reigers eten alles wat zij in ondiep water (zoet, brak en zelfs zout) kunnen vinden: kleine en grotere vissoorten, rivierkreeft (tegenwoordig zijn dat allemaal exotische soorten), salamanders en kikkers.
- Eten ook mollen en muizen als deze te pakken zijn.

